

คาถา 5ย กันสุนัขกัด

"อย่าแห่ย์ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยีบ อย่ายุ่ง"

ย1

อย่าแห่ย์
สุนัขให้โมโห



ย2

อย่าเหยียบ
หาง หัว ตัว ขา หรือ
ทำให้สุนัขตกใจ



ย3

อย่าแยก
สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า



ย4

อย่าหยีบ
จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหาร
ขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



ย5

อย่ายุ่ง
หรือเข้าไปใกล้สุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ



เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้


1

ล้างแผลให้สะอาด
ด้วยน้ำและสบู่หลายๆ
ครั้ง ให้ถึงก้นแผล
ล้างสบู่ออกให้หมด
เช็ดแผลให้แห้ง
ใส่ยารักษาแผลสด




2

จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้
เพื่อสืบหาเจ้าของ/
กักหมา-แมว
ไว้ดูอาการ 10 วัน
สอบถามประวัติ
การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า



3

ไปหาหมอหรือ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เพื่อรับการป้องกัน
ที่ถูกต้อง



สุนัขกัด ต้องล้างแผล 1สัปดาห์ กักหมา
หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อจนครบชุด



www.nontree.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โรคพิษสุนัขบ้า



**ป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง
จากการถูกสุนัขกัด**

" ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน "

3 ให้ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

- ให้ความรู้
- ให้วัคซีน
- ให้เมืองไทยปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า




โรคพิษสุนัขบ้า



โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต โดยพบมากที่สุดที่สุนัข และรองลงมาคือแมว

การติดต่อ



คนและสัตว์รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้ กัดหรือข่วน โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมวจะพบว่า มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน

"โรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้"

อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อย และขากรรไกรเนื้อ กระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติและตายในที่สุด

อาการที่พบในสุนัข

ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วน จะอยู่ในช่วง 3 - 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการซึ่งมีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม



โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม

ระยะตื่นเต้น

สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิดไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง



ระยะอัมพาต

สุนัขมีอาการค้างท้อยตกลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย้อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็วและตายในที่สุด



หากมีอาการแล้ว **ตายทุกราย**

คำแนะนำ สำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1
 นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2
 ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่นำสุนัขออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง

3
 ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิด ไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



หยุดปล่อยหมด หยุดปัญหาหมาจรจัด